



Arzneimittelkommission




Anzahl der Gesamtmeldungen (n)
1995 - 31.12.2016





■ Antibiotika ■ Analgetika
■ Lokalanästhetika ■ Sonstige

Nebenwirkungen nach Organsystemen bis 31.12.2016



UAW's Übersicht bis 31.12.2016

| Wirkstoffgruppe | Substanz | n | Gastrointestinaltrakt | Haut | Herz-Kreislauf | ZNS | Sonstige |
|--------------------|--------------------|----|--|--|--|---|---|
| Analgetika | Dexketo- profen | 1 | | | | Schlaf- losigkeit (1) | Rückenschmerzen, erhöhter Harndrang (1) |
| | Ibuprofen | 4 | | Exanthem ganzer Körper (1); Exanthem ganzer Körper, anaphylaktoide Reaktion (1); Exanthem gesamter Körper (1); Lippen- und Halsschwellung (1); Schleimhautrötung und Schwellung Mundhöhlenbereich (1) | Kreislaufbeteiligung (1) | | |
| | Oxaceprol | 1 | | Haarausfall (1) | | | |
| Antibiotika | Amoxicillin | 38 | Bauchschmerzen (1); blutige Diarrhoe, Übelkeit, Pilzbefall GIT, Unwohlsein (1); Durchfall (1); Durchfall, Erbrechen (1); Erbrechen, Übelkeit (1); Magenbeschwerden (1); starke Diarrhoe (2); Zungenbeläge, Durchfall (1) | akute Urtikaria Innenseiten Oberschenkel bds. Mit starkem Juckreiz (1); allergische Hautreaktion Rumpf, Arme, Beine, starke Rötung (1); allergische Hautreaktion, starke Rötung Rumpf und Extremitäten, Juckreiz (1); Ausschlag Arme und Beine (1); Ausschlag ganzer Körper (1); Ausschlag Gesicht mit geschwollen Augenlidern (1); Ausschlag, Rötung, Juckreiz gesamter Körper, Zunge rot, Mundtrockenheit (1); brennende Augen, Juckreiz (1); Emphysem der rechten Gesichtshälfte (1); Emphysem der Wange (1); Exanthem am ganzen Körper (2); Exanthem am ganzen Körper mit starkem Juckreiz (1); Exanthem am gesamten Körper (1); Exanthem ganzer Körper (2); Exanthem ganzer Körper, anaphylaktoide Reaktion (1); Exanthem gesamter Körper (1); Exanthem im Gesicht (1); Exanthem rote Pusteln ganzer Körper mit Juckreiz (1); Exanthem Schienbein Beginn über ganzen Körper ausbreitend (1); Ganzkörperexanthem, lang andauernder Juckreiz (1); geschwollenes Gesicht, nur Schwellung ohne Rötung, Emphysem der Wange, kein Schmerz (1); Hautausschlag, rote Flecken ganzer Körper, Hauttrockenheit, Verbrennungsgefühl Lippen (1); Hautausschlag, Rötung, Juckreiz (1); Hautreaktion kleine rote Punkte Stamm, Oberschenkel, Arme, Hals (1); Hautrötung gesamter Körper, Exanthem makulopapulös (1); Hautrötung Stirn, Brustbereich nach 3 Tagen (1); Jucken Fuß, Bauch, Rücken, belegte Zunge (1); juckender Ausschlag ganzer Körper (1); Ödem der Unterlippe (1); rote Pusteln in Armbeugen (1); Rötung an Armen und Thorax (1); Rötung Gesichtshaut (1); Schwellung Gesichtshälfte Wange bis Auge (1); Schwellung rechte Gesichtshälfte bis Auge (1); Urtikaria an Beinen, Bauch, Unterarmen | Kreislaufbeteiligung (1); kurzfristige Kreislaufprobleme (1); Luftnot (1) | Schwindel (1); starke Kopf- schmerz- en, Schweiß- ausbruch (1); subfebrile Tempera- tur (1) | erhöhte Temperatur (1); Halsschmerzen (1); Taubheitsgefühl , Schwäche, Schmerzen Beine (1) |

UAW's Übersicht bis 31.12.2016

| Wirkstoffgruppe | Substanz | n | Gastrointestinaltrakt | Haut | Herz-Kreislauf | ZNS | Sonstige |
|---------------------------------|-------------------------------|----|--|---|--|---|---|
| Antibiotika (Forts.) | Amoxicillin, Clavulansäure | 3 | Durchfall ab 2. Tag (1); Durchfall, Übelkeit (1) | Rötung und Ödem Haut und Schleimhäute (1) | Atemnot (1); Herzrasen, Blutdruckanstieg (1) | Schwindel (1) | |
| | Clindamycin | 19 | Blähungen, Durchfall (1); Brennen in der Speiseröhre (1); Durchfall, Magenschmerzen (1); Erbrechen, Oberbauchbeschwerden, Durchfall (1); extremer Durchfall (1); Morbus Crohn nach Einnahme (1); starke Übelkeit, Erbrechen (1); Verstopfung (1) | Ausschlag Hals, Rücken, Brust ab 3. Tag (1); Ausschlag Hand Zunge (1); belegte Zunge und Mundschleimhaut (1); Exanthemischer Hautausschlag (1); Händejucken mit Rotfärbung (1); Hautausschlag, rote Flecken ganzer Körper, Hauttrockenheit, Verbrennungsgefühl Lippen (1); Hautrötung an beiden Armen, Schwellung rechtes Knie (1); Pusteln, Juckreiz Arme und Beine (1); Rötung und Juckreiz ganzer Körper (1); starke Rötung des weichen Gaumens, Mucosa übersät mit Pusteln (1); Urtikaria beide Unterschenkel (1) | Atemnot (1); beklemmender Druck retrosternal (1) | Halluzinatio- nen (1); Neuromusku- läre Blockade linker Arm (1) | Gelenk- schwellungen Handgelenke und Knie ab 2. Tag (1) |
| | Metronidazol | 4 | blutige Diarrhoe, Übelkeit, Pilzbefall GIT, Unwohlsein (1); starke Übelkeit, gefurchte geschwollene Zunge (1) | Hautreaktion kleine rote Punkte Stamm, Oberschenkel, Arme, Hals (1); Lippen- und Halsschwellung (1); Schleimhautrötung und Schwellung Mundhöhlenbereich (1) | | subfebrile Temperatur (1) | |
| | Moxifloxacin | 1 | | | | epileptischer Anfall ohne Bewusstseins- verlust (1) | |
| | Sultamicillin | 3 | leichte Diarrhoe (1) | Exanthem am ganzen Körper (1); Schwellung Hände und Füße, Unterarme und Unterschenkel (1); Stomatitis buccal und sublingual bds., Aphthen (1) | | | |

UAW's Übersicht bis 31.12.2016

| Wirkstoffgruppe | Substanz | n | Gastrointestinaltrakt | Haut | Herz-Kreislauf | ZNS | Sonstige |
|------------------|-------------------------|----|---|---|---|---|--|
| Lokalanästhetika | Articain | 2 | | Rötung linke Armbeuge (1) | | Schüttelfrost, Abgeschlagenheit (1) | |
| | Articain, Adrenalin | 2 | Bauchschmerzen (1) | Emphysem der rechten Gesichtshälfte (1); lokale Rötung und Schwellung mit Brennen infraorbital und paranasal (1); Schwellung rechte Gesichtshälfte bis Auge (1) | | | |
| | Articain, Epinephrin | 13 | Appetitlosigkeit (1); Bauchschmerzen (1) | Ausschlag in Achselhöhle, Bauch, Unterschenkel, Füße (1); Emphysem der Wange (1); geschwollenes Gesicht, nur Schwellung ohne Rötung, Emphysem der Wange, kein Schmerz (1); Rötung linke Gesichtshälfte bis Brust, keine Schwellung (1); Schwellung Gesichtshälfte Wange bis Auge (1) | Herz- Kreislaufbeschwerde n (1); Puls- und RR- Anstieg, Unwohlsein (1); Unwohlsein, Angina pectoris, Herzrasen, Kreislaufprobleme (1) | Kopfschmerzen (2); Schüttelfrost, Schlappheit, Unwohlsein (1); Starkes Schwitzen, minutenlanger systemischer Tremor (1); Systemisches Körperzittern (1); Zittern, Druck im Ohr und Kopf (1) | Schmerzen im Einstichbereich und Zunge (1); schweißig, heißer Kopf (1); Verletzung beim brechen der Ampulle (1) |
| | Benzalkonium chlorid | 1 | | Stomatitis buccal und sublingual bds., Aphten (1) | | | |
| | Lidocain | 1 | | | | Schwindel, Unruhe, Pat. war nüchtern (1) | |
| | Lidocain, Prilocain | 2 | | Gesichtsschwellung und Rötung, streifiges Exanthem Unterarme Innenseite (1); Rötung Mund- und Nasenbereich (1) | | Schwindel (1); verstärkter Tremor, Unruhe (1) | |
| Sonstige | Alfacalcidol | 1 | | | | | Hypersensibilität aller Zähne (1) |
| | Amlodipin | 4 | | Gingivahyperplasie (1); Gingivahyperplasie OK und UK (1); massive Gingivahyperplasie (1) | | | Blutung, Schwellung, Taschenbildung (1) |

UAW's Übersicht bis 31.12.2016

| Wirkstoffgruppe | Substanz | n | Gastrointestinaltrakt | Haut | Herz-Kreislauf | ZNS | Sonstige |
|-----------------|-----------------------------------|---|---|--|--|---|--|
| Sonstige | Amlodipin, Hydrochlorothiazid | 1 | | Gingivahyperplasie mit starker Blutungsneigung (1) | | | |
| | Chlorhexidin | 4 | | Hautausschlag, Nesselsucht Dekolleté- Bereich (1); schmerzhaftes Brennen im Mund (1) | | Kopfschmerzen (1) | allergische Reaktion (1); allgemeines Unwohlsein (1) |
| | Colecalciferol (Vit. D) | 1 | | | | | Hypersensibilität aller Zähne (1) |
| | Denosumab | 1 | | | | | Nekrotisierung des unbezahnten Kieferknochens (1) |
| | Eisen(II)glycinsulfat | 1 | | | | | Hypersensibilität aller Zähne (1) |
| | Hydrochlorothiazid | 1 | | | | Sehstörungen li. Auge unscharfes Sehen, Gelb- Dunkelverfärbung Sehfeld (1) | |
| | Moxonidin | 2 | | Gingivitis, Blutungsneigung (1); lokalisierte Gingivitis, hyperplastisch, Blutungsneigung (1) | | | |
| | Olaflur, Dectaflur, Fluoridion | 1 | | | | | Atemnot (1) |
| | Pyranthel | 1 | Blähungen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchkrämpfe (1) | | Tachykardie 1/2 h nach Einnahme (1) | Gleichgewichtsstörungen, Sehstörungen, Doppelbildern (1); Schüttelfrost (1) | |
| | Rivaroxaban | 1 | | | | | massive Nachblutung 6 Tage nach Extraktion (1) |